

ABSTRAK

Ketuban pecah dini merupakan masalah penting dalam ilmu obstetri, karena berkaitan dengan penyulit kehamilan yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan maternal maupun terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine. Ketuban Pecah Dini diartikan sebagai salah satu komplikasi dalam kehamilan dengan ditemui, kondisi yang sangat rentan terjadi dan sangat membahayakan bagi ibu dan janin dalam kandungan (Sumardi,2013).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan dua pasien dengan primipara yang mempunyai masalah keperawatan ansietas pada pasien 1 pada tanggal 19 maret-21 maret 2019 dan pada pasie 2 tanggal 20 maret-22 maret 2019. Data yang dikumpulkan dengan cara WoD (Wawancara, Observasi, Documentasi) dengan instrument asuhan Keperawatan maternitas. Selajutnya data akan diolah dan diproses serta ditarik kesimpulan.

Dampak yang terjadi apabila ketuban pecah dini terjadi pada ibu primipara dengan ansietas maka akan mempengaruhi tumbuh kembang janin dimana keadaan ibu yang stress akan memberikan dampak seperti kekurangan oksigen pada bayi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pasie 1 intervensi dipertahankan dan dilanjutkan untuk mengurangi tingkat ansietas berat yang muncul sedangkan pada pasien 2 intervensi dipertahankan untuk mengurangi tingkat ansietas sedang. Dari hasil 3 kali observasi pada pasien 1 dan 2 tingkat ansietas kembali normal.

Kata kunci : Ketuban Pecah Dini, Primipara, Ansietas, Asuhan Keperawatan di ruang VK RSUD dr.Soedono Madiun

ABSTRACT

Premature rupture of membrane is an important problem in obstetric science, because it results in pregnancy that has a negative impact on maternal health and well-being as well as on the growth and development of intra-uterine fetuses. Premature rupture of membrane is interpreted as one of the complications in pregnancy by finding conditions that are very susceptible to occurrence and very harmful to the mother and fetus in the womb. (Sumardi, 2013).

The method used in this study was a case study method with two patients with primipara who had anxiety nursing problems on the dates: patient 1 March 19-21 March 2019 and patient 2 March 20-22 March 2019. Collected by WoD (interview, observation, documentation) with instruments *Nursing Care in Patients with Early Rupture of Amniotic Fluid in Primipara with Nursing Problems Anxiety in the VK Room of Dr. Sedono Madiun*. Furthermore, the data will be processed and conclusions will be drawn.

The impact that occurs if premature rupture of the membranes in primipara with anxiety will occur affecting fetal growth and development where the stressful condition of the mother will have an impact such as lack of oxygen in the baby.

Based on the results of the study in patients 1 the intervention was maintained and continued to reduce the level of severe anxiety that emerged while in patient 2 the intervention was maintained to reduce the level of 3 observations in patient 1 and 2 the level of anxiety returned to normal.

Keywords: premature rupture of membranes, primipara, anxiety, nursing care in the VK room of RSUD dr. Soedono Madiun